

Dolthene[®] 22,65 mg/ml

Oxfendazol



Eigenschappen:

- Enige in Nederland geregistreerde product met oxfendazol voor honden.
- Werkzaam tegen maagdarmnematoden en cestoden.
- Suspensie voor oraal gebruik die via het voer of rechtstreeks in de bek gegeven kan worden.
- Veilig toepasbaar tijdens de lactatie.
- Verkrijgbaar in flacons van 20, 50 en 100 ml.

Dolthene[®] 22,65 mg/ml

Registratiehouder / Registratienummer

Doharma Research B.V. /
REG NL 7888 / VRIJ

Verpakking

Flacon 20 ml
Flacon 50 ml
Flacon 100 ml

Farmaceutische vorm

Suspensie voor oraal gebruik

Samenstelling

Per ml:
Oxfendazol 22,65 mg

Doeldieren

Hond

Indicaties

Hond:

Bestrijding van maagdarmparasieten -en lintworminfecties bij pups en volwassen honden.

- Maagdarmparasieten: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala* en *Trichuris vulpis*.
- Cestoden: *Taenia pisiformis* en *Dipylidium caninum*.

Toediening/dosering

Hond:

Oraal, direct in de bek of over het voer
10 mg oxfendazol per kg lichaamsgewicht per dag,
gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Goed schudden voor gebruik. Bepaal nauwkeurig het gewicht van het dier en meet met behulp van bijgeleverde doseerspuit de juiste hoeveelheid van het product af. 1 volle doseerspuit is voldoende voor 10 kg lichaamsgewicht. Ofwel verspreiden over het voer (zorgen dat de hond de hele bak goed leeg eet) ofwel goed achter in de bek spuiten. Spuit na ieder gebruik schoonmaken.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Bijwerkingen

Maagdarmparasieten, zoals braken, diarree of anorexie, en systemische symptomen, zoals lethargie, kunnen in zeldzame gevallen voorkomen.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met lokale overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Aan het begin van de dracht dient terughoudendheid te worden betracht met betrekking tot het gebruik van dit middel, in verband met mogelijke embryotoxische effecten. Het product kan veilig worden toegepast in de laatste 14 dagen van de dracht. Het product kan veilig worden toegepast tijdens de lactatie.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Bewaren in goed gesloten verpakking.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 60 maanden.