

 **PURINA**
PRO PLAN®
VETERINARY
DIETS

Begrijp de
**URINEWEGEN
VAN UW KAT**



 **PURINA**

Your Pet, Our Passion.®

Begrijp de urinewegen van uw kat

Erachter komen dat uw kat lijdt aan een urinewegaandoening, kan erg verontrustend zijn, vooral omdat problemen met de urinewegen soms een medische noodsituatie kunnen zijn, of telkens terugkeren en onaangenaam zijn voor uw kat. Hoewel de oorzaken van urinewegproblemen complex zijn, kunt u gerust zijn: er zijn een aantal eenvoudige stappen die u kunt nemen om uw kat te helpen zich beter te voelen.

Indien u vermoedt dat uw kat FLUTD zou kunnen hebben, dan is het belangrijk dat u met uw kat een bezoek brengt aan uw dierenarts. Hij kan u enkele diagnostische testen adviseren om naar de onderliggende oorzaak te zoeken, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw kat de juiste behandeling krijgt. Voor een langdurige behandeling van FLUTD is het het meest effectief dat een 'holistische' benadering wordt toegepast. Dit omvat:

- Verhoog de inname van water
- Veranderen en verrijken van de omgeving
- Voeding: geef een specifieke dieetvoeding die is samengesteld voor de dieetbehandeling van urinewegproblemen

Wat is Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD)?


Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) is een veel voorkomende aandoening bij katten. Katten zijn slechte drinkers en ze produceren urine die sterk geconcentreerd is. Als gevolg daarvan zijn ze vatbaarder voor urinewegproblemen.

Er zijn verschillende onderliggende oorzaken van FLUTD. De meest voorkomende oorzaak is Feline Idiopathische Cystitis (FIC). Idiopathisch betekent simpelweg dat de oorzaak niet bekend is. Een dierenarts zal de diagnose FIC pas stellen wanneer andere oorzaken zijn uitgesloten.


FLUTD kan ook worden veroorzaakt door kristallen of stenen die bestaan uit zouten die van nature in de urine van katten voorkomen. Struviet en calciumoxalaat komen het meeste voor. Ze kunnen aangroei en blokkade van ieder deel van de urinewegen veroorzaken.

Veel voorkomende urinekristallen bij katten

Urine wordt geproduceerd door de nieren. Er kunnen zich kristallen of stenen vormen die de uitstroom van urine in ieder deel van de urinewegen kunnen blokkeren.



Microscopisch uiterlijk van veel voorkomende urinekristallen:



Struvietkristallen



Calciumoxalaatkristallen

Wat zijn de verschijnselen van FLUTD?

- Moeite met plassen
- Miauwen tijdens het plassen
- Overmatig likken van het genitale gebied
- Buiten de kattenbak plassen
- Bloed in de urine
- Angstig, nerveus of agressief gedrag (bij sommige katten)

Urinestenen worden gewoonlijk opgespoord of bevestigd door middel van een röntgenonderzoek of een echo. Uw dierenarts zal waarschijnlijk ook enkele urine- en bloedtesten adviseren om te zoeken naar onderliggende oorzaken.

Waarschuwing! Katten met een volledige blokkade van de urinewegen zullen steeds angstiger worden en overstuur raken. **Een blokkade van de urinewegen is een noodsituatie** en u dient uw kat onmiddellijk naar een dierenarts te brengen om te worden behandeld.

Sommige katten meer dan andere?

Risicofactoren die bijdragen aan FLUTD omvatten:

- Weinig consumptie van water
- Overgewicht of obesitas
- Steriliseren, castreren, vooral bij mannetjeskatten
- Binnenkatten met weinig of geen mogelijkheden om naar buiten te gaan
- Onvoldoende lichaamsbeweging
- Emotionele of omgevingsstress
- Stress doordat er meerdere katten in huis zijn of door plotselinge veranderingen in de dagelijkse routine



Hoe wordt FLUTD behandeld?

Afhankelijk van het type urinestenen zullen ze moeten worden opgelost of chirurgisch worden verwijderd. Een speciaal ontwikkelde dieetvoeding (zoals PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline UR St/Ox Urinary™) kan helpen bij het oplossen van aanwezige struvietstenen.

Voeding is belangrijk


Feline UR St/Ox Urinary is samengesteld op wetenschappelijke basis om aanwezige kristallen en stenen (struviet) in de urineblaas te helpen oplossen. Feline UR St/Ox Urinary helpt ook het risico verminderen dat urinestenen zich weer opnieuw vormen in uw kat (zowel struviet als calciumoxalaat), en kan ook bijdragen aan het behandelen van Feline Idiopathische Cystitis.

Het is voor wat betreft voedingsstoffen een complete dieetvoeding met een geweldige smaak, verkrijgbaar in verschillende smaken zodat uw kat van iedere maaltijd kan genieten en u er gerust op kunt zijn dat ze de dieetvoeding ook op de lange termijn zal accepteren. De effectiviteit van Feline UR St/Ox Urinary bij de behandeling van FLUTD is bevestigd met behulp van de analysemethode voor RSS, waarmee de hoeveelheid in de urine aanwezige kristallen wordt bepaald. De "St/Ox"-claim in de naam van Feline Urinary benadrukt de **werkzaamheid van de dieetvoeding** ter bevordering van een urinesamenstelling die zal helpen bij het oplossen van struvietstenen, en het risico op de vorming van nieuwe calciumoxalaat- en struvietstenen zal verminderen.

Het **verhogen van de waterinname** is ook een belangrijk punt bij de behandeling van FLUTD. **Toevoegen van natte voeding** aan de actuele dieetvoeding i.v.m. de urine, in de vorm van bijvoorbeeld een zakje of een blikje, kan helpen om de urine te verdunnen.



Voordelen voor uw kat wanneer u Feline UR St/Ox Urinary geeft



Met St/Ox urinezekerheid

Om het risico op de vorming van struviet- en oxalaatkristallen en -stenen te verminderen.



Oplossen van struviet

Bevordert het oplossen van struvietstenen in de urine.



Matige hoeveelheid calorieën*

Om te helpen een ideaal lichaamsgewicht te behouden (obesitas is een risicofactor voor FLUTD).

* Droge samenstelling en natte voeding in zakjes

Tips om het terugkeren van FLUTD in uw kat te helpen verminderen:

1. Geef een speciale veterinaire voorgeschreven diëtvoeding, zoals Feline UR St/Ox Urinary.
2. Voeg natte voeding toe aan de actuele voeding om de waterinname van uw kat te verhogen.
3. Stimuleer uw kat om water te drinken door een drinkbak van metaal of van aardewerk te gebruiken in plaats van een plastic drinkbak. Plastic kan een bijmaak geven en de smaak van het water bederven. Of stimuleer uw kat om te drinken door een waterfontein te gebruiken.
4. Controleer regelmatig de lichaamsconditie van uw kat. Indien hij overgewicht heeft, dan kan uw dierenarts u helpen om te beginnen met een programma voor gewichtsverlies.
5. Stimuleer lichamelijke inspanning door speeltjes, een krabpaal, enz. te geven, en speel dagelijks met uw kat.
6. Zorg voor zo min mogelijk grote veranderingen in de routine van uw kat om iedere vorm van stress te laten afnemen.
7. Zorg voor voldoende kattenbakken (doorgaans één voor iedere kat, plus eentje extra) op een rustige, veilige plek in het huis.
8. Introduceer een nieuwe voeding geleidelijk over een periode van 5 tot 10 dagen.
9. Geef kleine maaltijden meerdere keren op een dag.

Purina: een naam waar u op kunt vertrouwen

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS hebben een gedegen wetenschappelijke achtergrond. De nieuwste bevindingen op het gebied van voeding zijn toegepast om u te voorzien van de meest innovatieve en effectieve samenstellingen.

Met Feline UR St/Ox Urinary natte en droge producten kunt u er zeker van zijn dat uw kat zal profiteren van een optimale voeding terwijl tegelijkertijd ook de urinewegaandoening wordt behandeld.

Voedingsrichtlijnen voor Feline UR St/Ox Urinary

Dit voedingsprogramma wordt slechts als richtlijn geadviseerd. Stel het bij om uw kat op zijn optimale lichaamsgewicht te houden. Zorg er te allen tijde voor dat er vers drinkwater in een schone drinkbak beschikbaar is. Gebruik het enkel zoals aangegeven door uw dierenarts.

Aanbevolen tijdsduur voor gebruik: Voor het oplossen van struvietstenen wordt een initiële voedingsperiode van 5-12 weken geadviseerd. Bij langdurig gebruik wordt een initiële voedingsperiode tot 6 maanden geadviseerd, maar de kat dient regelmatig opnieuw te worden beoordeeld zoals geïndiceerd door de onderliggende aandoening.

VOEDINGSAANBEVELINGEN:

Dagelijkse hoeveelheid voeding							
Lichaams- gewicht (kg)	Droge voeding (g/dag)	Natte voeding (blikjes/ dag)	Natte voeding (zakjes/ dag)	Combinatie van droge voeding en blikjes		Combinatie van droge voeding en zakjes	
				Droge voeding (g/dag)	Blikjes/ dag	Droge voeding (g/dag)	Zakjes/ dag
2	30	2/3	1+1/2	10	1/2	25	1/2
3	45	1	2+1/2	25	1/2	35	1
4	65	1+1/3	3+1/2	15	1	50	1
5	80	1+2/3	4	35	1	50	2
6	95	2	5	50	1	50	3
7	110	2+1/3	6	70	1	65	3
8	125	2+2/3	6+1/2	85	1	85	3

Voor iedere kg lichaamsgewicht meer, voed 15 g droge voeding of 1/2 blikje per dag extra.

PURINA®
PRO PLAN®
VETERINARY
DIETS



Uw dierenarts:

Neem voor meer informatie contact op met uw dierenarts of met
Nestlé Purina PetCare, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen,
van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur
0800 - 022 83 83 (gratis)

www.purina.nl/proplan/veterinarydiets

Alle aanwijzingen voor PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets in deze brochure zijn bedoeld ter ondersteuning
van het dieet van honden en katten met de genoemde aandoeningen en sluiten medische zorg niet uit.
Veterinaire voeding moet worden gegeven onder toezicht van een dierenarts.

©Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.



Your Pet, Our Passion.®